

FERTILIZANTE FOLIAR

# BORANDO® 15

LIQUIDO CONCENTRADO (151 g B / Litro)

GRADO: 5-0-0

COMPOSICIÓN

Nitrógeno total .....	4,80 %
Boro .....	10,97 %
Agua y coadyuvantes c.s.p .....	100,00 %

pH (al 1%): 8,5

Densidad: 1,38 g/ml

Tensión superficial: 39,10 dyn/cm

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

SENSA N° 13.547

Contenido neto:

N° de lote

Fecha de vencimiento:

INDUSTRIA ARGENTINA

Formulador y Distribuidor:



Defensa 540 - C1065AAJ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 Tel: (011) 4342-4459 (Líneas rotativas) - Fax: (011) 4331-9162  
 Web site: www.andoycia.com.ar E-mail: info@andoycia.com.ar

**BORANDO®15** es un fertilizante líquido, altamente concentrado en boro, soluble en agua, indicado para la corrección mineral de cultivos extensivos, horticolas, frutales, forestales, ornamentales, almácigas, vid, etc. **MODO DE APLICACIÓN**

**BORANDO®15** puede aplicarse con cualquier equipo de pulverización motorizado (terrestre o aéreo) o de mochila. Pulverizar la solución sobre los cultivos hasta mojarlos completa y uniformemente sin producir goteo o escurrido. Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común; no obstante, se recomienda comprobar su compatibilidad antes de usarlo, o consultar con S. Ando y Cia. S.A.C.I.I.F.

**MODO DE EMPLEO**

Agitar el envase antes de usar el producto. Verter el producto cuando el tanque se encuentra a 1/4 de su capacidad llena con agua; a continuación completar su capacidad. Mantener la agitación constantemente. **BORANDO®15** posee tensioactivo en su formulación; para aumentar aún más la efectividad de la aplicación se recomienda usar un tensioactivo no iónico, no polar, al 0,05 por mil.

LA FERTILIZACIÓN FOLIAR ES COMPLEMENTARIA Y NO UN SUSTITUTO DE LA FERTILIZACIÓN DE BASE (INCORPORADOS AL SUELO). PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTÁCTESE CON EL PROFESIONAL INGENIERO AGRÓNOMO O REPRESENTANTE LOCAL

**RECOMENDACIONES DE USO:** La dosis por hectárea varía según cultivo, necesidad correctiva y volumen de agua a aplicar.

**DOSIS GENERAL RECOMENDADA:** 1 - 3 L de **BORANDO® 15/ Ha**

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS L/Ha	CONCENTRACIÓN DE USO cc/HL	ÉPOCA, NÚMERO E INTERVALOS DE APLICACIÓN
FRUTALES CÍTRICOS	2 - 3		En estado de yema o botón floral abierto.
FRUTALES PEPITA	1 - 2		Después de la cosecha y antes del cambio de color de las hojas. A botón rosado (2 tratamientos)
FRUTALES DE CAROZO	1 - 2		A yema rosa y caída de pétalos.
FRUTILLA	1		Yema blanca y 15 días después.
VID	1		A botón floral abierto y cuaje.
CEREALES / MAÍZ	3		6-8 hojas. Repetir a las 2 semanas.
OLEAGINOSAS / GIRASOL	3		Estado vegetativo hasta botón floral.
ALFALFA	1		Después de cada corte.
COLES	3		De 4 a 6 hojas.
ARÁNDANO		200-500	En época de reposo vegetativo hasta diferenciación de yemas florales.

**PRECAUCIONES:**

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO ALMACENAR CON COMBUSTIBLES, PRODUCTOS CORROSIVOS O INFLAMABLES, NI CON MATERIALES ORGÁNICOS.
- NO APLICAR EN HORAS DE FUERTE INSOLACIÓN O ELEVADAS TEMPERATURAS O CON ROCÍO. SE DEBIERA UTILIZAR CON EL AGREGADO DE UN TENSIOACTIVO (NO POLAR, NO IÓNICO) O JUNTAMENTE CON PLAGUICIDAS.
- EVITAR SU APLICACIÓN EN CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS (TÉRMICAS O HÍDRICAS).
- NO APLICAR EN CULTIVOS BAJO COBERTURA PLÁSTICA.
- SE RECOMIENDA APLICAR PREFERENTEMENTE AL ATARDECER, PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE LAS PLANTAS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

S. Ando y Cia. S.A.C.I.I.F. garantiza la calidad del fertilizante foliar **Borando®15**, pero como su empleo se hace fuera de nuestro control, el usuario se responsabilizará por los riesgos derivados del uso incorrecto de este producto, distinto del que indicamos en este marbete. Para un correcto asesoramiento, recurrir al profesional Ingeniero Agrónomo.

Cod: 0818A